


SORGO ICI 730



Comportamiento con respecto a **ENFERMEDADES**

- El Sorgo ICI 730 es resistente al Downy mildew producido por *Peronosclerospora sorghi*.

Presenta tolerancia a:

- Antracnosis foliar producida por *Colletotrichum graminicola*.
- Pudrición carbonosa de la base del tallo producida por *Macrophominia phaseolina*.



Sembramos Futuro!

Carrera 34 No.14-156 Urbanización Acopi-Yumbo Colombia
Teléfono: 6668139 Fax: 6668138 E-mail: serviciante@semillasvalle.com

SORGO ICI 730

ADAPTABILIDAD Y RENDIMIENTO



Sembramos Futuro!

SORGO ICI 730

Características AGRONÓMICAS

DÍAS A FORMACIÓN
DE PRIMORDIO FLORAL: 23 - 25

DÍAS A 50% DE FLORACIÓN: 52 - 55

DÍAS A COSECHA: 95 - 110

ALTURA DE PLANTA (cms): 130 - 140

LONGITUD DE EXCERCIÓN (cms): 15 - 20

TIPO DE PANOJA: Semiabierta

CONTENIDO DE TANINOS: Bajo

COLOR DE GRANO: Bronce

ADAPTACIÓN:
Valle del Cauca
Tolima
Huila
Caribe seco

Recomendaciones de SIEMBRA

RENDIMIENTO DE SORGO ICI 730 CON DIFERENTES POBLACIONES
(Miles de Plantas /Ha)



Recomendaciones

- El Sorgho ICI 730 se adapta a un amplio rango de poblaciones.
- Establezca entre 250.000 y 350.000 plantas por hectárea.
- Distancia entre surcos 40 y 50 cms.
- Coloque entre 20 y 25 semillas por metro.
- Establezca entre 15 y 18 plantas por metro.

Índice de semilla: 28.000 a 30.000 semillas por Kg.

Consumo de semilla por hectárea: entre 16 y 18 Kg.

Precaución

No utilice agroquímicos **ORGANOFOSFORADOS**, pueden producir quemazón al cultivo y reducir drásticamente el rendimiento.

Rendimiento

6.000 a 9.500 Kg/Ha